

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO, CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.



ARROZONE 57 EC

HERBICIDA – ANILIDA, ISOXAZOLIDINONA
PROPANIL, CLOMAZONE

ATENCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

SOLVENTE: Xileno

DENSIDAD: 1,10 g/mL a 20°C

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE O SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO: Herbicida de uso agrícola.

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN: Propanil es un herbicida de contacto y clomazone es un herbicida sistémico y de contacto. Propanil inhibe la fotosíntesis y la fijación de CO₂ y Clomazone posee traslocación acrópeta por el xilema, impide la síntesis de los carotenoides, inhibe la formación de isoprenoides: precursores del pigmento fotosintético.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Este producto puede aplicarse con equipos de aspersión terrestres y aéreos, utilizando boquillas indicadas para herbicidas que produzcan gotas finas y una cobertura homogénea como las boquillas de abanico plano. El personal que manipule este producto deberá usar el siguiente equipo de protección: Botas y guantes de hule, mascarilla, protector de ojos, pantalón y camisa de manga larga. Calibre correctamente su equipo de aplicación inicialmente con agua, verifique que el mismo se encuentre en buen estado de funcionamiento y sin fugas.



FORMAS DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA :

Observe que el equipo de aplicación esté en condiciones adecuadas de uso. El personal que manipule el producto debe utilizar equipo de protección. Llenar el tanque de aspersión con agua limpia hasta la mitad, agregue la dosis correcta del producto y agite para que se mezcle homogéneamente con el agua y complete el volumen de agua. Esta mezcla forma una emulsión y se aplica como aspersión. Después de aplicar, lave cuidadosamente el equipo de aplicación. El pH del agua debe estar entre 5.5 a 6.5.



RECOMENDACIONES DE USO: Para Guatemala.

Cultivo	Plaga	Dosis	Observaciones
Arroz <i>Oryza sativa</i>	Malezas de hoja ancha Malva de flor pequeña <i>Malva parviflora</i> Escoba amarga <i>Parthenium hysterophorus</i> Hierba de pollo <i>Commelina difusa</i> Malezas gramíneas Arrocillo <i>Echinochloa crus-galli</i> Hierba del gusano <i>Acalypha arvensis</i> Coquito, Coyolillo <i>Cyperus rotundus</i> Zacate de agua <i>Echinochloa colonum</i>	4 - 5 L/ha (2.8 - 3.5 L/mz)	La aplicación debe efectuarse cuando el 90% de las malezas tenga 3 hojas y en suelos con una humedad adecuada. Utilizar un volumen de agua de 200 - 400 L/ha (140 - 280 L/mz). En arroz de riego, se puede realizar mojes para estimular la germinación de las malezas y luego aplicar el producto a la dosis recomendada para controlar las malezas hasta el establecimiento de la lámina de agua.

Para El Salvador, Honduras, Panamá

Cultivo	Plaga	Dosis	Observaciones
Arroz <i>Oryza sativa</i>	Malezas de hoja ancha Malva de flor pequeña <i>Malva parviflora</i> Escoba amarga <i>Parthenium hysterophorus</i> Hierba de pollo <i>Commelina difusa</i> Bledo Amarantus spp. Verdolaga Portulaca oleracea Pata de paloma <i>Boerhavia erecta</i> Malezas gramíneas Arrocillo <i>Echinochloa crus-galli</i> Hierba del gusano <i>Acalypha arvensis</i> Coquito, Coyolillo <i>Cyperus rotundus</i> Zacate de agua <i>Echinochloa colonum</i> Plumilla <i>Leptochloa filiformis</i> Salea <i>Digitaria sanguinalis</i> Zacate pacho <i>Ixophorus unisetus</i> Mozote <i>Cenchrus spp.</i> Zacate amargo <i>Eleusine indica</i>	4 - 5 L/ha (2.8 - 3.5 L/mz)	La aplicación debe efectuarse cuando el 90% de las malezas tenga 3 hojas y en suelos con una humedad adecuada. Utilizar un volumen de agua de 200 - 400 L/ha (140 - 280 L/mz). En arroz de riego, se puede realizar mojes para estimular la germinación de las malezas y luego aplicar el producto a la dosis recomendada para controlar las malezas hasta el establecimiento de la lámina de agua.

Para Nicaragua

Cultivo	Plaga	Dosis	Observaciones
Arroz <i>Oryza sativa</i>	Malezas de hoja ancha Bledo <i>Amarantus sp.</i> Siempre viva <i>Commelina sp.</i> Pata de paloma <i>Boerhavia erecta</i> Verdolaga <i>Portulaca oleracea</i> Malezas gramíneas Arrocillo <i>Echinochloa sp.</i> Plumilla <i>Leptochloa filiformis</i> Pasto de cuarema <i>Digitaria sanguinalis</i> Zacate honduras <i>Ixophorus unisetus</i> Mozote <i>Cenchrus sp.</i>	4 - 5 L/ha (2.8 - 3.5 L/mz)	La aplicación debe efectuarse cuando el 90% de las malezas tenga 3 hojas y en suelos con humedad adecuada. Utilizar un volumen de agua de 200 - 400 L/ha (140 - 280 L/mz). En arroz de riego, se puede realizar mojes para estimular la germinación de las malezas y luego aplicar el producto a la dosis recomendada para controlar las malezas hasta el establecimiento de la lámina de agua.

La aplicación debe efectuarse cuando el 90% de las malezas tenga 3 hojas y en suelos con humedad adecuada. Aplicar preferentemente en horas de la mañana, cuando la temperatura no exceda los 25 °C, la humedad relativa sea alta y no existan amenazas de lluvia en un período de 4 a 8 horas. No se debe aplicar cuando el viento favorezca el arrastre del producto hacia áreas cultivadas con algodón, plátano, frijol, yuca, frutales y otros cultivos de hoja ancha porque estos son extremadamente susceptibles a la acción del herbicida.

INTERVALO DE APLICACIÓN: Una aplicación por temporada.
INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: 60 días.
INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: 24 horas.

FITOTOXICIDAD: No presenta efectos de fitotoxicidad en el cultivo de arroz.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de herbicidas utilizados en cultivos de arroz. Se recomienda hacer una pequeña prueba antes de aplicar el producto. No se debe aplicar en mezcla con insecticidas fosforados o carbamatos. Aplicar **ARROZONE 57 EC**, 14 días antes o 14 días después de la aplicación de insecticidas fosforados y carbamatos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN. GUANTES, BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA, DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Este producto debe almacenarse y transportarse alejado de alimentos, ropa, forraje u otros plaguicidas y fertilizantes. Mantenga el producto solamente en su envase original en un lugar inaccesible para niños y mascotas. Almacene en un lugar fresco y seco. No almacene en o cerca de casas habitación.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Irritación en piel y mucosas. Náuseas, vómitos, cólicos abdominales y diarrea, labios y uñas azules, sangrado de nariz; la repetida exposición por cualquier ruta puede causar cianosis.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTIÓN: No induzca el vómito. Lleve de inmediato al paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE INHALACIÓN: mueva la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

UNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MÉDICO: Dar tratamiento sintomático y de soporte general.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

PAÍS	INSTITUCIÓN	TELÉFONO
GUATEMALA	Centro de Información y Asesoría Toxicológica	(502) 2251-3560, 2232-0735 y 1-801-00-2983
EL SALVADOR	Hospital Nacional Rosales	(503) 2231-9262
NICARAGUA	Centro Nacional de Toxicología	(505) 2289-4700 Ext. 1294, Cel: 8755-0983
PANAMA	Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos	(507) 523-4946 y 523-4948
HONDURAS	Hospital Escuela Universitario	(504) 2232-2322, Ext.494, 420 y 478

PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

TÓXICO PARA PECES O CRUSTÁCEOS.



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO, CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

Este producto es persistente en el suelo y no persistente en agua. El producto es ligeramente inflamable y corrosivo, no es explosivo. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue este al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las regulaciones locales. Recoja lo derramado con un material absorbente como aserrín

RESPETE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y ÁREAS FRÁGILES.

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVORECEN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO.

ASEGURESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUSES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES Y DESECHOS REMANENTES.

Los remanentes de plaguicidas sin utilizar deben mantenerse en su envase original debidamente cerrado y etiquetado. Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos, perfórelos o trítirelos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue este al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las regulaciones locales. Recoja lo derramado con un material absorbente como aserrín o arena.



EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA

El formulador y registrante garantizan que el contenido de este envase se encuentra conforme a las especificaciones de composición físico químicas del producto y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Este producto se vende en el entendido de que el comprador asume todos los riesgos del uso, manejo, almacenamiento y disposición del producto que estén fuera del control del vendedor y, que puedan resultar en pérdidas o daños al comprador o a cualquier tercero en sus personas o bienes.

FORMULADO POR:

WESTRADE GUATEMALA, S.A.
15 Ave. 11-028 Zona 3, Colonia Monte Alegre
Tecún Umán, Ayutla, San Marcos, Guatemala C.A.
PBX: (502) 7932-0000, Fax: (502) 7932-0030
Correo electrónico: servicioalcliente@duwest.com

IMPORTADOR:

DUWEST GUATEMALA
2a. Avenida, 10-45, zona 9,
Ciudad de Guatemala, Guatemala C. A.
Tel: (502) 2321-4747

DUWEST NICARAGUA
Km. 6.5 Carr. Norte, de las antiguas Of. de Siemens
200 mt al sur contiguo al Hospital Alemán
Nicaraguense, Ciudad de Managua, Nicaragua, C. A.
Tels.: (505) 2248-9030 y (505) 2240-1675

DUWEST HONDURAS
Boulevard del Norte, Río Blanco,
Contiguo a El Colonial,
San Pedro Sula, Honduras, C. A.
Tels: (504) 2551-5948 al 49

DUWEST EL SALVADOR

Calle Siemens No. 56 Zona Industrial
Santa Elena Antiguo Cuscatlán,
La Libertad, El Salvador, C. A.
Tel.: (503) 2521-1200

DUWEST CRUZ DEL SUR PANAMÁ

Vía Interamericana frente a Durman Esquivel,
David, Chiriquí, Panamá
Tel.: (507) 775-2368

PAÍS Y NÚMERO DE REGISTRO

GUATEMALA	381-174
EL SALVADOR	381-174
NICARAGUA	WT-62L-2022
PANAMA	
HONDURAS	